

Encuesta en tasas de cesárea óptimas

Información sobre el estudio

Ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobre tasas de cesárea óptimas. El propósito de este estudio es recabar diversas opiniones con respecto a las tasas óptimas de cesárea en partos con diferentes características. Esta encuesta online lleva tan sólo 10 minutos completarla. Los resultados de este estudio brindarán información para el desarrollo de una clasificación de necesidades para las intervenciones de cesárea.

Su decisión de participar en este estudio es completamente voluntaria y Ud. tiene el derecho de terminar su participación en cualquier momento cerrando su navegador. Puede omitir cualquier pregunta que no desee contestar.

Su participación en esta investigación es completamente confidencial y sus datos serán recogidos e incluidos en un promedio general.

Estoy de acuerdo con estos términos:

- He leído y entendido lo expresado anteriormente
- Afirmo que soy un doctor con experiencia en el campo de las cesáreas en los últimos 5 años, y,
- Haciendo clic en el botón de 'aceptar', yo indico mi disposición a formar parte de este estudio voluntariamente.

1. Información básica:

- ¿Cuál es su género? (femenino, masculino)
- ¿Cuál es su edad? (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o mayor)
- ¿Cuál es su ocupación principal? (médico obstetra, médico (no-obstetra), médico no clínico (médico de salud pública), investigador académico, institución internacional/no-gubernamental, estudiante)
- ¿En qué país completó sus estudios en obstetricia (o su formación en medicina, si no está especializado)?
- ¿En qué país ganó mayor experiencia en obstetricia?
- ¿En qué tipo de centros trabajó en obstetricia recientemente? (público, privado lucrativo, privado no lucrativo, otro)
- ¿En qué nivel de centros trabajó en obstetricia recientemente? (centro de atención médica primaria, hospital de distrito, hospital de referencia regional, hospital de referencia nacional o universitario, no aplicable (ej. Clínica independiente privada), otros)?
- De todos los partos realizados en su institución en un año, ¿qué porcentaje de nacimientos fueron por cesárea? (0-14%, 15-29%, 30-49%, 50% o más elevado, no lo sé)
- ¿Cómo ha recibido la invitación para participar en este estudio? (email del grupo, email personal, link en Facebook, link en Twitter, otros)?

- Introduzca su dirección de correo electrónico si desea que se le mantenga informado de los resultados del estudio (opcional)

2. Tasas de cesárea óptimas:

Para cada uno de los siguientes características obstétricas, por favor indique qué proporción de mujeres debe recibir una cesárea para asegurar el bienestar óptimo de la madre y el feto (del 0 al 100%).

Por favor, considere ambas opciones, cesáreas planeadas y cesáreas de emergencia (antes de or durante lo trabajo de parto) en una población general.

	De 1000 mujeres con las siguientes características, qué proporción de mujeres debe recibir una cesárea para asegurar el bienestar óptimo de la madre y el feto (del 0 al 100%)?
1. Características obstétricas	
Placenta previa completa	
Desprendimiento de la placenta con hemorragias	
Ruptura uterina	
Presentacion transversa/oblicua	
Presentacion de cara o frente	
Presentacion de nalgas	
Desproporcion cefalo-pelvica mayor	
Trabajo de parto prolongado (fase activa del trabajo > 6 horas)	
Intervención de cesárea previa	
Embarazo de gemelos	
Eclampsia (convulsiones,feto vivo)	
Pre-eclampsia (presión sanguínea >140/90 y ++ proteinuria, feto vivo)	
Diabetes materna (gestacional o pre-gestacional)	
Parto prematuro (<34 semanas)	
Prolapso del cordón umbilical	
2. Características reproductivas y nutricionales (incluso complicaciones	

obstétricas asociadas)	
Múltipara (partos 2-5), parto de feto único, ningún otro factor de riesgo conocido en el inicio de la entrega	
Peso neonato >4,000g (pesado después del parto)	
Peso neonato <2,500g (pesado después del parto)	
Gran múltipara (partos ≥6)	
Nulípara	
Altura de la madre <150cm / <5"0'	
IMC de la madre 25-30	
IMC de la madre >30	
Antecedente materno de muerte fetal	
Antecedente materno de muerte perinatal	
Edad de la madre >35	
3. óptima tasa de cesárea entre todos los partos	
De todos los partos en todo el mundo, ¿qué proporción debe recibir una cesárea para los resultados maternos y fetales óptimas?	